

重要影响。

[参 考 文 献]

[1] 吕凤菊. 先天性食道闭锁的早期诊断:附 24 例分析. 金华医学,1992,(增刊):25~27.
[2] 胡劲,张泽伟. 先天性食道闭锁的外科治疗. 浙江医科大学学

报,1992,21:178~179.
[3] Engum SA, Grosfeld JL, West KW, et al. Analysis of morbidity and mortality in 227 of esophageal and/or tracheoesophageal fistula over two decades. Arch Surg, 1995, 130: 505~507.
[4] 韩茂棠,胡银莲,耿铭慧. 先天性食道闭锁外科处理的经验与教训,中华小儿外科杂志,1988,9:76~77.
(收稿日期:1999-10-11 修回日期:1999-12-27)
(本文编辑:吉耕中)

· 病例报告 ·

卡马西平致大疱表皮松解萎缩坏死型药疹 1 例

魏久贞 李德亮 邢建军

[中图分类号] R758.25 [文章编号] 1008-8830(2000)01-0032-01

卡马西平致药疹国内曾有报道^[1]。1997 年 10 月我科收治 1 例服用该药致严重药疹患儿,现报告如下:

1 临床资料

患儿,男,12 岁。3 岁时因间断抽搐,经脑电图检查确诊为癫痫,服用抗痫灵,苯巴比妥等药物治疗,病情一度好转。近期发作频繁,当地医生推荐改服卡马西平。按 100mg/次,每日 3 次,服用 2d 后,出现全身疱疹伴发热、瘙痒,随之水疱融合成大水疱,部分破溃,高热,体温 39℃,无抽搐。当地疑药疹,用药效果不明显,皮疹逐渐扩大,增多,累及全身转来本科。既往无药物过敏史。体格检查 T 37.8℃,P 112 次/min,R 30 次/min,体重 20kg,Bp100/65mmHg,发育营养差,神志清楚,智力差。全身皮肤满布大疱疹,可见暗红色出血斑,躯干部已融合成片,部分皮肤已剥脱露出红色糜烂面,面积大者约 10cm×8cm。眼结膜糜烂,渗出,口腔粘膜大疱,糜烂,渗出,双耳廓皮肤暗红,外耳道无分泌物流出,颈软,双肺闻及少许痰鸣者,心腹未见异常。神经系统无阳性体征。实验室检查:血常规,血红蛋白 120g/L,红细胞 380×10¹²/L,白细胞 5.3×10⁹/L,中性 0.58,淋巴 0.42,血小板 312×10⁹/L,尿常规:白细胞少许,尿液 pH 值 7.5。入院诊断:大疱性表皮松解萎缩坏死型药疹;癫痫。入院后停用卡马西平,给予先锋霉素防治感染,适量激素,钙剂,大剂量维生素 C,扑尔敏,息

斯敏及能量支持疗法,苯巴比妥应用,治疗 16d 愈出院。

2 讨论

卡马西平(酰胺咪嗪,得理多),是治疗癫痫,躁狂症,三叉神经痛的主要药物。儿童按每日 10~20mg/kg,分次服。近年来,有关卡马西平致严重不良反应国内屡有报道。如剥脱性皮炎^[2],大疱性表皮松解萎缩坏死型药疹全血细胞减少及肝损害^[3]。目前认为该药致药疹,与该药剂量,药理作用及毒性反应无关。而与服药者的体质因素有关^[1]。药疹是否与该药衍生基团有关,有待研究。笔者认为对过敏体质或有过敏倾向者应慎用或不用。

[参 考 文 献]

[1] 张强,孙道开. 卡马西平致药源性皮肤及肝脏损害 2 例报告. 中国实用儿科杂志,1997,2:124.
[2] 张玮,孟淑美. 卡马西平致皮疹 2 例. 中国药事,1998,5:314.
[3] 邓仰福,李素卿. 卡马西平致药疹及全血细胞减少 1 例. 中国临床药理学杂志,1999,5:323.
(收稿日期:1999-07-13 修回日期:1999-11-29)
(本文编辑:吉耕中)

[作者简介] 魏久贞,女,1963 年出生,大学本科,主治医师,副主任。
[作者单位] 253100 山东省平原县第一人民医院儿科