·论著·

成年大鼠骨髓基质细胞体外诱导 分化为 NSE 阳性细胞

贾延劼, 杨于嘉, 宋元宗

(中南大学湘雅医院儿科教研室, 湖南 长沙 410008)

[摘要] 目的 研究成年大鼠骨髓基质细胞(MSCs)在体外分化为NSE阳性细胞的方法。方法 采用β-巯基乙醇预诱导MSCs 24h,再诱导5h。神经细胞特异性烯醇化酶(NSE)免疫细胞化学染色鉴定、计数诱导前后的细胞。结果 诱导后MSCs形态改变,胞体呈锥形,突起交织成网。免疫细胞化学染色NSE表达率达到(63.7 ± 4.5)%。结论 β-巯基乙醇可以诱导成年大鼠MSCs在体外分化成为NSE阳性细胞。

[关键词] 骨髓基质细胞;神经细胞特异性烯醇化酶;β-巯基乙醇;大鼠

[中图分类号] Q241 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1008-8890(2001)01-0025-03

Differentiation of Adult Rat Bone Marrow Stromal Cells Into NSE-positive Cells

JIA Yan-Jie, YANG Yu-Jia, SONG Yuan-Zong

Department of Pediatrics, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008, China

Abstract: **Objective** To study the protocol that induces adult rat bone marrow stromal cells (MSCs) to express neuron-specific enolase (NSE) in vitro. **Methods** MSCs were preinduced with β-mercaptoethanol for 24 h, and then induced for 5 h. The positive percentages of NSE protein expression were measured by immunocytochemistry SABC staining. **Results** After the induction, MSCs displayed neuronal morphologies, such as pyramidal cell bodies and processes which formed extensive networks. The positive percentage of NSE protein expression was (63.7 ± 4.5)%. **Conclusions** β-mercaptoethanol may induce adult rat MSCs to NSE-positive cells in vitro.

Key words: Bone marrow stromal cells; Neuron-specific enolase; β-mercaptoethanol; Rat

神经细胞移植是治疗神经系统退行性变的有效方法之一。但是神经细胞属于终末细胞,难以进行有丝分裂,因此很难获得足够的神经细胞移植体,限制了这项技术的临床应用。2000年8月,Woodbury等^[1],Sanchez-Ramos等^[2]均采用骨髓基质细胞(marrow stromal cells, MSCs)在体外诱导成为神经细胞。我们在此基础上,体外诱导成年SD大鼠MSCs分化为NSE(神经细胞特异性烯醇化酶)阳性细胞,获得初步成功,现报道如下。

1 材料与方法

1.1 主要试剂

DMEM培养基购自Gibco BRL公司,胎牛血清购自TBD生物技术发展中心,β-巯基乙醇(纯度>99.0%)、HEPES、L-谷氨酰胺、胰蛋白酶(1:300)、HistoChoice MB购自AMRESCO公司,兔抗大鼠NSE抗体、抗兔SABC免疫组化试剂、DAB显色试剂盒购自武汉博士德生物工程有限公司。

[收稿日期] 2000-12-30; [修回日期] 2001-02-05

[作者简介] 贾延劼(1971-),男,博士,主治医师,湘雅医院儿科博士后研究人员。

1.2 大鼠 MSCs 培养

参考 Azizi 等^[3]方法略改进。成年 SD 大鼠,雌雄不限。无菌条件下取双侧胫骨, D-Hank's 液清洗, 5 ml DMEM 完全培养基(添加 20% 胎牛血清, 10 mM HEPES, 2 mM L-谷氨酰胺, 100 U/ml 青霉素, 100 mg/ml 链霉素)仔细冲洗骨髓腔, 将冲洗下的细胞稀释后, 直接接种于 24 孔塑料培养板, 37℃, 8% CO₂ 培养。24 h 后换液, 去除未贴壁细胞。以后每隔 72 h 换液。待贴壁细胞完全融合后, 0.25% 胰蛋白酶消化传代, 按 1×10^5 /ml 接种, 每隔 72 h 换液, 共传 3~4 代后进行诱导实验。

1.3 诱导实验

参考 Woodbury 等的方法^[1]。主要步骤为: MSCs 完全融合后, 进行预诱导。去除 DMEM 完全培养基, D-Hank's 液清洗 3 次, 加入预诱导液(DMEM 培养基, 20% 胎牛血清, 1 mM β -巯基乙醇), 37℃, 8% CO₂ 培养 24 h。预诱导后, 加入诱导液(DMEM 培养基, 5 mM β -巯基乙醇), 37℃, 8% CO₂ 培养 5 h, 0.01 M PBS 液(pH 7.4)清洗 3 次, HistoChoice MB 固定。对照实验 1 为空白对照, 即预诱导液和诱导液均去除 β -巯基乙醇; 对照实验 2 在诱导液中去除 β -巯基乙醇; 对照实验 3 在预诱导液中去除 β -巯基乙醇。

1.4 生长和诱导情况观察

倒置显微镜下, 观察 MSCs 生长情况, 及预诱导和诱导后形态学变化。

1.5 NSE 免疫细胞化学染色记数

参考 SABC 试剂盒说明操作, DAB 显色, 常规脱水, 透明。光镜下观察, 随机记数 200 个细胞, 计算阳性细胞数目。其中兔抗大鼠 NSE 抗体稀释度为 1:100, 对照实验以 0.01 M PBS 液(pH = 7.4)代替 NSE 抗体。

1.6 统计处理

采用 χ^2 检验, 以 $P < 0.05$ 为显著性差异。

2 结果

2.1 生长情况观察

刚接种的细胞种类较多, 包括造血干细胞及分化程度不同的其他各系细胞、MSCs 等, 经过数次换液后, 培养 14 d 细胞以造血干细胞和 MSCs 等贴壁生长的细胞为主, 且 MSCs 融合成片。经 3~4 次传代后, 形成较典型的 MSCs, 其形态特点是: 梭形细胞较少, 梭形, 生长较快; 圆形细胞为主要类型, 大而扁平, 立体感不强, 生长较慢。同时, 混有少量造血

干细胞(图 1)。

图 1 大鼠 MSCs 形态特点, (第 3 代) $\times 200$
Figure 1 Morphological characteristics of rat MSCs, (passage 3) $\times 200$

2.2 诱导情况观察

预诱导 24 h 后, 细胞体积减小, 立体感增强, 部分胞体收缩成锥形或球形, 伪足收缩成较细长突起, 少量细胞脱落、死亡。诱导 5 h 后, 绝大多数细胞成锥形, 伪足收缩成细长突起, 并交织成网, 立体感强, 部分细胞周围有光晕, 类似神经细胞(图 2)。对照实验 1 形态基本没有变化; 对照实验 2 仅部分细胞形态学发生变化; 对照实验 3 虽然有一定量的细胞形态类似神经细胞, 但是细胞脱落、死亡过多。

图 2 大鼠 MSCs 诱导分化后形态特点, 类似神经细胞, 胞体呈锥形, 突起交织成网。 $\times 200$

Figure 2 Morphological characteristics of rat MSCs - differentiated cells. It displayed neuronal morphologies, such as pyramidal cell bodies and processes which formed extensive networks. $\times 200$

2.3 NSE 免疫细胞化学染色记数

对照实验 1 MSCs 基本不表达 NSE,仅个别细胞为弱阳性 ($< 5\%$)。对照实验 2 NSE 表达率较低,为 $(16.5 \pm 6.5)\%$,而且部分细胞表达弱阳性。对照实验 3 大部分细胞表达 NSE 阳性或强阳性,其表达率为 $(46.3 \pm 7.6)\%$,较对照实验 2 相比,差异有显著性 ($P < 0.01$),但是很多细胞脱落、死亡。预诱导 24 h + 诱导 5 h 后, MSCs 表达率最高,为 $(63.7 \pm 4.5)\%$,与对照实验 2,3 相比,差异有显著性 (均 $P < 0.01$)。其中聚集成团的分化细胞 NSE 表达为强阳性;未分化的细胞仍保持原来的扁平形态, NSE 表达为阴性或弱阳性 (图 3,4 见插页)。

3 讨论

MSCs 是一种多能干细胞,可以分化成为成骨细胞、软骨细胞、脂肪细胞等。如果将大鼠 MSCs 移植到新生或成年大鼠脑内,可以分化成为星形胶质细胞^[3,4]。而且 MSCs 获得方法简单,易于增殖,采用合适的体外培养方法,培养 6 周 MSCs 细胞增殖 10^9 倍,一次骨髓穿刺获得的人 MSCs 很快可达 10^{13} 个^[5]。因此, MSCs 成为神经细胞移植和基因治疗的理想细胞^[6]。

MSCs 在体外分化成为神经细胞目前采用的方法有两种,抗氧化剂^[1]和生长因子^[2]诱导。但是前者快速、分化率较高。我们实验证明, MSCs 基本不表达 NSE。采用抗氧化剂 - 巯基乙醇预诱导 24 h + 诱导 5 h 后, $63.7 \pm 4.5\%$ 细胞表达 NSE。虽然仅依据 NSE 表达断定为神经细胞尚不完全,但是至少提示 MSCs 在朝神经细胞方向分化,说明该方法是可行的。而且整个分化诱导过程是连续的、逐步的,省略预诱导期或诱导期,都可能影响分化率。

- 巯基乙醇诱导作用尚不清楚,但是部分抗氧化剂有此作用,如二甲基亚砷、叔丁对甲氧酚 (butylated hydroxyanisole) 等^[1]。研究证实,活性氧在细胞增殖分化过程中起到第二信使的作用^[7], - 巯基乙醇作为一种抗氧化剂,是否通过改变 MSCs 细胞内的氧化还原状态使其分化为 NSE 阳性细胞有待进一步研究。

[参 考 文 献]

- [1] Woodbury D, Schwarz EJ, Prockop DJ, et al. Adult rat and human bone marrow stromal cells differentiate into neurons [J]. *J Neurosci Res*, 2000, 61 (4): 364 - 370.
- [2] Sanchez - Ramos J, Song S, Cardozo - Pelaez F, et al. Adult bone marrow stromal cells differentiate into neural cells in vitro [J]. *Exp Neurol*, 2000, 164 (2): 247 - 256.
- [3] Azizi SA, Stokes D, Augelli BJ, et al. Engraftment and migration of human bone marrow stromal cells implanted in the brains of albino rats - similarities to astrocyte grafts [J]. *Proc Natl Acad Sci USA*, 1998, 95 (7): 3908 - 3913.
- [4] Kopen GC, Prockop DJ, Phinney DG. Marrow stromal cells migrate throughout forebrain and cerebellum, and they differentiate into astrocytes after injection into neonatal mouse brains [J]. *Proc Natl Acad Sci USA*, 1999, 96 (19): 10711 - 10716.
- [5] Colter DC, Class R, DiGirolamo CM, et al. Rapid expansion of recycling stem cells in cultures of plastic - adherent cells from human bone marrow [J]. *Proc Natl Acad Sci. USA*, 2000, 97 (7): 3213 - 3218.
- [6] Li Y, Chopp M, Chen J, et al. Intrastriatal transplantation of bone marrow nonhematopoietic cells improves functional recovery after stroke in adult mice [J]. *J Cereb Blood Flow Metab*, 2000, 20 (9): 1311 - 1319.
- [7] Schreck R, Rieber P, Baeuerle PA. Reactive oxygen intermediates as apparently widely used messengers in the activation of the NF- κ B transcription factor and HIV-1 [J]. *EMBO J*, 1991, 10 (8): 2247 - 2258.

(本文编辑:曹励之)