

本文检查结果,未发现肺炎支原体和肺炎衣原体二者重叠感染病例。

[参 考 文 献]

[1] 丁国芳,万伟琳. 小儿慢性咳嗽 [J]. 国外医学儿科分册, 1995, 22(1): 15 - 16.

[2] 水彩慧. 小儿慢性咳嗽 268 例临床分析[J]. 中国当代儿科杂志, 2000, 2(6): 413 - 414.

[3] 支文清,郭建峰,王兴河,等. 北京市城区儿童肺炎衣原体感染的血清流行病学调查 [J]. 中华儿科杂志, 1996, 36(3): 180 - 182.

[4] 阿日根,高娃. 小儿衣原体感染 [J]. 临床儿科杂志, 1994, 12(3): 176 - 177.

(本文编辑:吉耕中)

病例报告 ·

新生儿麻疹合并肺炎 2 例报告

苏蓉

(西安市临潼区人民医院,陕西 西安 710600)

[中图分类号] R511.1 [文献标识码] E

例 1,男,26 d。因皮疹、咳嗽 4 d,加重 2 d 就诊。4 d 前家长发现患儿颜面颈部出现红色皮疹,伴发热,体温 38.5℃,偶咳。其母正患麻疹。体检:体温 36℃,脉搏 180 次/min,呼吸 78 次/min。全身皮肤发灰,可见散在的淡红色皮疹,压之褪色。双眼睑肿胀,双眼球结膜轻度充血。口腔颊粘膜及口唇内侧可见麻疹粘膜斑。两肺可闻及密集的中小湿性罗音。心律齐,心音低钝,心率 180 次/min,未闻及病理性杂音。腹微胀,肝右肋下 4.0 cm,剑突下 4.5 cm,质软,肠鸣音弱。实验室检查 WBC $6.7 \times 10^9/L$,N 0.35, L 0.64。测血清抗麻疹 IgM 抗体(+)。给予吸氧纠酸,强心利尿,抗感染支持对症治疗。5 d 后皮疹开始消退,有棕褐色色素沉着斑及麦麸样脱屑,治疗 9 d 痊愈出院。最后诊断:新生儿麻疹合并重症肺炎、心衰。

例 2,男,23 d。以面部皮疹 5 d 就诊。其母 1 周前患麻疹。体检:体温 36.5℃,脉搏 150 次/min,呼吸 56 次/min。全身可见散在的大小不等的红色、淡红色斑丘疹,高出皮面,压之褪色,以颈部、躯干部

为多。颜面轻度发灰,隐约可见淡红色皮疹。双眼睑明显肿胀,球结膜充血,双眼脓性分泌物多。口腔粘膜可见密集的麻疹粘膜斑。两肺呼吸音粗糙,两肺底可闻及细小湿罗音。心腹未见异常。实验室检查 WBC $11.0 \times 10^9/L$,N 0.37, L 0.62。测血清抗麻疹 IgM 抗体(+)。给予吸氧纠酸,抗感染支持对症治疗。入院后出现间断发热,最高体温 38.5℃。咳嗽重。住院 6 d 后皮疹开始消退,有棕褐色色素沉着斑及麦麸样脱屑。

麻疹是一种急性病毒性呼吸道传染病,麻疹病人是唯一的传染源,以 6 个月至 5 岁小儿发病率最高,肺炎是最常见的并发症,也是引起麻疹病人死亡的重要原因。本组两例均发生在新生儿期,由于患儿年龄小,不易引起家长的重视,并发症的出现易掩盖病情,以致延误诊治,加重病情。因此要加强人们对麻疹等传染病的认识,按时预防接种,如孕母或新生儿有麻疹接触史者,应立即肌注麻疹免疫球蛋白,或血清免疫球蛋白,以避免孕母及新生儿感染麻疹。

(本文编辑:吉耕中)