论著·临床研究

叶酰多聚谷氨酸合成酶基因一个新的 错义突变的发现

胡椿艳^{1,2} 岳丽杰¹ 于洁² 张洪洪¹ 杨春兰^{1,2}

(1. 重庆医科大学附属深圳市儿童医院儿科研究所, 广东 深圳 518026;

2. 重庆医科大学附属儿童医院血液科, 重庆 400014)

【摘要】目的 研究叶酰多聚谷氨酸合成酶(*FPGS*)基因编码区突变及多态性在中国汉族急性白血病(AL)患儿与健康儿童中的频率分布特征,为探讨*FPGS*基因多态性与肿瘤化疗个体化用药之间的关系提供理论依据。**方法** 采用PCR-DGGE结合DNA直接测序的方法对91例AL患儿和124例上呼吸道感染儿童(对照组)的*FPGS*基因第5号外显子的突变及多态性情况进行分析,计算等位基因频率和基因型频率并分析其差异性。**结果** 在对照组儿童*FPGS*编码区中发现了一个国内外未见报道的错义突变502/490 T>C(L151/101P),分别在*FPGS*线粒体型和胞浆型中发现了新突变2例和3例,并鉴定了其等位基因频率为0.70%(胞浆型)和0.47%(线粒体型)。这个新的错义突变与儿童AL无明显的相关性。**结论** 首次在中国汉族儿童中发现*FPGS*外显子5的一个新的错义突变502/490 T>C(L151/101P),其在中国汉族儿童中的等位基因频率为0.70%(胞浆型)和0.47%(线粒体型)。

[中国当代儿科杂志,2012,14(7):529-532]

【关键词】 叶酰多聚谷氨酸合成酶基因;单核苷酸多态性;急性白血病;儿童

【中图分类号】 R725.5 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1008-8830(2012)07-0529-04

A novel missense mutation of folypolyglutamate synthetase gene

HU Chun-Yan, YUE Li-Jie, YU Jie, ZHANG Hong-Hong, YANG Chun-Lan. Institute of Pediatrics, Shenzhen Children's Hospital of Chongqing Medical University, Shenzhen, Guangdong 518026, China (Yue L-J, Email: lijieyue@yahoo.com)

Abstract: Objective To examine allelic frequencies of coding single nucleotide polymorphisms (cSNPs) of folypolyglutamate synthetase (*FPGS*) gene in Chinese Han children with acute leukemia (AL), in order to provide a basis for detecting the relationship between *FPGS* genetic polymorphisms and tumor individualized chemotherapy. **Methods** cSNPs of exon 5 were detected with polymerase chain reaction (PCR) - denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) in 91 children with AL and 124 children with upper respiratory infection as controls. Genotypes and allelic frequencies were examined. **Results** A novel missense mutation, 502/490 T>C(L151/101P), was found in exon 5 of *FPGS* from control children. The novel mutation was found in mitochondrial variants in two cases and cytosolic variants in three cases. The cytosolic and mitochondrial variants displayed allelic frequencies of 0.70% and 0.47% respectively. The novel mutation was not associated with susceptibility to AL. **Conclusions** A novel missense mutation 502/490 T>C(L151/101P) in exon 5 of *FPGS* gene is firstly found in Chinese Han children, and the cytosolic and mitochondrial variants display allelic frequencies of 0.70% and 0.47% respectively. [Chin J Contemp Pediatr, 2012, 14(7):529-532]

Key words: Folypolyglutamate synthetase gene; Single nucleotide polymorphism; Acute leukemia; Child

叶酰多聚谷氨酸合成酶(folypolyglutamate synthetase, *FPGS*)催化叶酸及叶酸拮抗剂多聚谷氨酸化形成相应的多聚谷氨酰衍生物,是叶酸拮抗剂类抗肿瘤药物如甲氨喋呤(methotrexate, MTX)、培美曲塞等在细胞内代谢过程中的关键酶^[1]。MTX是目前急性白血病(acute leukemia, AL)治疗中最有

效的药物之一,对MTX耐药可导致绝大多数AL治疗失败。体内外研究表明,*FPGS*低表达或突变是MTX类药物耐药的一个重要原因^[2-5]。近年来,关于人类*FPGS*基因多态性的研究被陆续报道,其多态性越来越受到关注^[6-7]。本研究以AL患儿及急性上呼吸道感染患儿作为研究对象,旨在阐明中国

[收稿日期]2011-12-29; [修回日期]2012-03-28

[项目基金]国家自然科学基金资助项目(No. 30471830);深圳市科技计划项目(No. 200802065)。

[作者简介]胡椿艳,女,硕士研究生。

[通信作者]岳丽杰,教授。

图2 502/490 T>C(L151/101P)测序代表图 箭头代表变异的碱基。

2.2 FPGS 突变分析

借助于215例cDNAs片段的PCR-DGGE分析及DNA序列测定,本研究在国内外首次发现了FPGS基因外显子5的一个新的错义突变502/490 T>C,此突变在FPGS基因的两种亚型中均有发现。线粒体型和胞浆型变异在对照组儿童中的等位基因频率分别为0.81%和1.21%,AL患儿中未检测到变异,故线粒体型和胞浆型变异的等位基因总频率分别为

0.47%和0.70%。两种亚型的等位基因频率差异无统计学意义($\chi^2 = 0.20, P > 0.05$)。两种亚型变异碱基的定位、氨基酸改变、等位基因频率和基因型在两组人群中的分布见表1。本组研究人群并未检测出473/461位点变异。

经 χ^2 检验,本研究中FPGS 502/490 T>C基因频率分布符合Hardy-Weinberg平衡定律,具有群体代表性。

表1 中国汉族儿童FPGS 502/490 T>C多态性

亚型	碱基改变	外显子位置	氨基酸改变	等位基因频率(%)		
				白血病组(n=91)	对照组(n=124)	总频率(r^2)
线粒体型	502T>C	5	Leu ¹⁵¹ >Pro	0(0 CT,0 CC)	0.81(2 CT,0 CC)	0.47
胞浆型	490T>C	5	Leu ¹⁰¹ >Pro	0(0 CT,0 CC)	1.21(3 CT,0 CC)	0.70

3 讨论

作为叶酸拮抗剂药物代谢过程中的关键酶,FPGS在叶酸拮抗剂类抗肿瘤药物(如MTX、培美曲塞等)的体内代谢中起着重要作用。以MTX为例,在ATP催化下,FPGS可以迅速地将进入细胞内的MTX连接上长度不等的谷氨酸,形成MTX多聚谷氨酸盐。细胞内MTX的多聚谷氨酸化能防止其从细胞内流出;与单谷氨酸形式相比,多聚谷氨酸形式与靶酶的亲和性显著增高^[1]。细胞内存在两种亚型的FPGS:胞浆型(cFPGS)和线粒体型(mFPGS),cFPGS和mFPGS源自同一基因即FPGS基因,由于第1号外显子使用了不同起始密码子的开放阅读框而导致表达产物有所不同:mFPGS包含一段50个氨基酸的线粒体引导肽而cFPGS没有。cFPGS和mFPGS共同构成了FPGS酶的活性^[9]。

FPGS基因多态性可导致其表达水平、活性等的改变,近年研究发现FPGS mRNA低表达及突变都可导致叶酸拮抗剂抵抗,因此研究FPGS基因多态性对恶性肿瘤的药物治疗及预后具有重要指导意义^[10]。目前,国外研究较多的是FPGS基因几个标

签单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphisms, SNPs)与肿瘤易感性及预后关系的研究,关于编码区的SNPs(coding SNPs, cSNPs)研究则比较少,国内未见报道^[11-12]。本研究应用PCR-DGGE技术对215例样本(包括91例AL患儿和124例对照儿童)FPGS基因的第5号外显子进行扫描分析,以获得此外显子的SNPs情况。

本研究发现了一个目前国际上尚未报道的错义突变。这个新的错义突变是在FPGS基因502/490碱基位点发生T→C置换,引起亮氨酸突变为脯氨酸即L151/101P。该变异在FPGS两种亚型的编码基因中均有发现,5例出现异常电泳带型的样本中2例为线粒体型变异即L151P,另外3例为胞浆型变异即L101P。在本研究人群中,对照组儿童T151/101C的等位基因频率为1.21%(L101P)和0.81%(L151/P),AL组未检出此变异,其总等位基因频率为0.70%(L101P)和0.47%(L151/P)。T151/101C变异是一个新的错义突变,由于FPGS氨基酸的改变,推测其有可能改变FPGS酶活性,进而影响FPGS的正常功能,对MTX类抗肿瘤药物的耐药性产生一定的影响。由于检出的T151/101C标本均为杂合子,且例数较少(线粒体型2例,胞浆型3例),关于此突变可能引起

的酶活性改变还需进一步的功能分析研究阐明。另外,本研究中未发现 NCBI 数据库中第 5 号外显子唯一已知的 cSNP 位点 473/461 (R141/91R) 突变,推测可能与 SNPs 的种族差异性有关,中国汉族人群中可能并不存在此 SNP 位点,但尚需更多的或者进一步大样本量研究证实。

目前对于 *FPGS* 基因多态性与 MTX 类叶酸拮抗剂抗肿瘤治疗的研究才刚刚开始,本项研究发现了 *FPGS* 基因一个新的错义突变 T151/101C,确定了其在中国汉族儿童中的等位基因频率,由于这是国内外第一次发现的变异,有必要大样本量检测此变异在其他种族的多样性分布和研究多态性导致的功能改变,进一步研究 *FPGS* 基因多态性与 MTX 类抗肿瘤药物耐药的关系,从而明确 *FPGS* 在肿瘤化疗个体化用药中的角色。

[参 考 文 献]

[1] Gorlick R, Groken E, Trippett T, Waltham M, Banerjee D, Bertino JR. Intrinsic and acquired resistance to methotrexate in acute leukemia[J]. N Engl J Med, 1996, 335(14): 1041-1048.

[2] Wang Y, Zhao R, Goldman I. Decreased expression of the reduced folate carrier and folypolyglutamate synthetase is the basis for acquired resistance to the pemetrexed antifolate (LY231514) in an L1210 murine leukemia cell line[J]. Biochem Pharmacol, 2003, 65(7): 1163-1170.

[3] Liani E, Rothem L, Bunni M, Smith C, Jansen G, Assaraf YG. Loss of folypoly-gamma-glutamate synthetase activity is a dominant mechanism of resistance to polyglutamylated novel antifolates in multiple human leukemia sublines[J]. Int J Cancer,

2003, 103(5): 587-599.

[4] Stark M, Wichman C, Avivi I, Assaraf YG. Aberrant splicing of folypolyglutamate synthetase as a novel mechanism of antifolate resistance in leukemia[J]. Blood, 2009, 113(18): 4363-4369.

[5] 孙利,沈佐君,何晓东. 氨甲蝶呤对映体耐药 A549 细胞株中叶酰聚谷氨酸合成酶 mRNA 和蛋白表达[J]. 安徽医科大学学报, 2011, 46(6): 549-522.

[6] Yanagimachi M, Naruto T, Hara T, Kikuchi M, Hara R, Miyamae T, et al. Influence of polymorphisms within the methotrexate pathway genes on the toxicity and efficacy of methotrexate in patients with juvenile idiopathic arthritis[J]. Br J Clin Pharmacol, 2011, 71(2): 237-243.

[7] Adjei AA, Mandrekar SJ, Dy GK, Molina JR, Adjei AA, Gandara DR, et al. Phase II trial of pemetrexed plus bevacizumab for second-line therapy of patients with advanced non-small-cell lung cancer: NCCTG and SWOG study N0426 [J]. J Clin Oncol, 2010, 28(4): 614-619.

[8] 杨天楹. 急性白血病[M]//张之南. 血液病诊断及疗效标准. 第2版. 北京: 科学出版社, 1998: 168-214.

[9] McGuire JJ, Russell CA, Balinska M. Human cytosolic and mitochondrial folypolyglutamate synthetase are electrophoretically distinct. Expression in antifolate-sensitive and-resistant human cell lines[J]. J Bio Chem, 2000, 275(17): 13012-13016.

[10] Leclerc GJ, York TA, Hsieh-Kinser T, Barredo JC. Molecular basis for decreased folypoly-gamma-glutamate synthetase expression in a methotrexate resistant CCRF-CEM mutant cell line [J]. Leu Res, 2007, 31(3): 293-299.

[11] Figueiredo JC, Levine AJ, Lee WH, Lonti DV, Poynter JN, Campbell PT, et al. Genes involved with folate uptake and distribution and their association with colorectal cancer risk[J]. Cancer Causes Control, 2010, 21(4): 597-608.

[12] Warren RB, Smith RL, Campalani E, Eyre S, Smith CH, Barker JN, et al. Outcomes of methotrexate therapy for psoriasis and relationship to genetic polymorphisms[J]. Br J Dermatol, 2009, 160(2): 438-441.

(本文编辑:王庆红)