论著·临床研究

儿童噬血细胞性淋巴组织细胞增生症的 预后因素分析

陆文娴 罗建明

(广西医科大学第一附属医院儿科, 广西南宁 530021)

[摘要] **目的** 通过总结儿童噬血细胞性淋巴组织细胞增生症(HLH)的临床特征,分析相关因素与预后的关系,探索影响HLH患儿预后的因素。**方法** 回顾性分析63例HLH患儿的病例资料,使用Kaplan-Meier法绘制生存曲线,采用COX模型对影响预后的相关因素进行单因素分析,筛选出有意义的因素进行多因素COX回归分析。**结果** 患儿的3年及5年生存率均为62.9%;确诊后第1天至4个月,生存率由98.4%降至73.2%。影响疾病预后单因素分析中,具有统计学意义的因素只有治疗后2~3周血小板恢复情况($P=0.002$);在使用依托泊苷治疗的患儿中,治疗1d后体温恢复情况对预后的影响具有统计学意义($P=0.016$)。**结论** HLH患儿的预后较为满意,但确诊后的前4个月生存率下降快。治疗2~3周后血小板恢复情况以及使用依托泊苷1d后体温恢复情况影响患儿预后。

[中国当代儿科杂志,2012,14(8):593-597]

[关键词] 噬血细胞性淋巴组织细胞增生症;预后;儿童

[中图分类号] R725.5 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1008-8830(2012)08-0593-05

Prognostic factors for hemophagocytic lymphohistiocytosis in children

LU Wen-Xian, LUO Jian-Ming. Department of Pediatrics, First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, Nanning 530021, China (Luo J-M, Email: luojm06@163.com)

Abstract: Objective To study the main factors influencing prognosis of hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) in children by summarizing the clinical features of HLH and investigating the relationship between relevant factors and prognosis. **Methods** The medical data of 63 children with HLH were retrospectively reviewed. Kaplan-Meier method was employed to draw survival curves. Factors influencing prognosis were assessed with Cox univariate analysis, and Cox multivariate analysis was done on statistically significant factors. **Results** The 3-year and 5-year survival rates were both 62.9%. The survival rate decreased from 98.4% at 1 day after definite diagnosis to 73.2% at 4 months. Univariate analysis demonstrated only one factor, which was that the condition of platelet recovery after treatment of 2 to 3 weeks was significantly related to prognosis ($P=0.002$). In children receiving etoposide therapy, temperature recovery after one day of treatment was significantly related to prognosis ($P=0.016$). **Conclusions** Children with HLH have a satisfactory prognosis, but the survival rate reduces rapidly in the first 4 months after definite diagnosis. Platelet recovery after treatment of 2 to 3 weeks and temperature recovery after one day of treatment are factors influencing prognosis of HLH in children.

[Chin J Contemp Pediatr, 2012, 14(8):593-597]

Key words: Hemophagocytic lymphohistiocytosis; Prognosis; Child

噬血细胞性淋巴组织细胞增生症(HLH)是一组单核-巨噬细胞系统反应性增生,进而发生过度的炎症反应,造成多组织器官损害的综合征。促炎症反应的细胞因子不断生成,巨噬细胞和细胞毒性T淋巴细胞浸润多组织是HLH最显著的特点^[1]。HLH最常见的临床表现包括发热、脾大、三系血细胞减少等^[2],其临床特点与多种疾病相似,如细菌、病毒感染、结缔组织病、恶性肿瘤等,因而给诊断带来了一

定的难度^[1]。家族性HLH年发病率约0.12/10万^[3],若不治疗,其中位生存期仅为2个月^[4]。虽然部分继发性HLH可自发缓解,但其死亡率仍相当高^[5]。为了更好地观察疾病活动情况,及时制定治疗措施,需要了解影响疾病发展和预后的因素,本研究通过对在我院确诊为HLH患儿的临床特征进行总结,分析对HLH预后影响的危险因素,并进行生存分析了解其长期生存率。

[收稿日期]2012-02-25;[修回日期]2012-04-17

[作者简介]陆文娴,女,硕士研究生。

[通信作者]罗建明,主任医师。

1 资料与方法

1.1 研究对象

2005年1月至2010年12月在我院确诊为HLH患儿63例,其中男42例,女21例;年龄7个月至14岁,平均年龄4.3岁。63例患儿均无HLH家族史。

1.2 HLH的诊断标准

63例患儿均符合HLH-2004诊断标准^[2]:分子诊断符合HLH或满足以下诊断标准8项中的5项:(1)发热;(2)脾脏肿大;(3)血细胞减少(两系或两系以上细胞减少),Hb < 90 g/L(小于4周的婴儿Hb < 100 g/L),PLT < 100 × 10⁹/L,中性粒细胞 < 1.0 × 10⁹/L;(4)高甘油三酯血症(空腹甘油三酯 ≥ 3.0 mmol/L)或低纤维蛋白原血症(纤维蛋白原 ≤ 1.5 g/L);(5)在骨髓、脾脏或淋巴结中发现噬血现象,但无恶性疾病表现;(6)NK细胞活性降低或缺失;(7)铁蛋白 ≥ 500 μg/L;(8)可溶性CD25(即可溶性IL-2受体) ≥ 2400 U/mL。

1.3 治疗

根据病情程度制定不同治疗方案。轻者仅予病因治疗或加用地塞米松,病情严重者按照HLH-2004中的化疗方案^[2]给予治疗,即地塞米松、依托泊苷及环孢素A联合化疗。63例患儿中,57例接受了化疗,仅接受地塞米松治疗者7例,同时使用地塞米松、依托泊苷治疗者23例,联合使用地塞米松、依托泊苷及环孢素A者27例;5例只予抗感染治疗,1例仅予对症治疗。

1.4 预后判断

患儿的预后分为缓解、疾病活动、疾病复发及死亡。缓解的判断标准为:(1)无发热;(2)无脾脏肿大;(3)无血细胞减少(Hb ≥ 90 g/L, PLT ≥ 100 × 10⁹/L,中性粒细胞 ≥ 0.5 × 10⁹/L);(4)无高甘油三酯血症;(5)铁蛋白低于500 μg/L;(6)脑脊液检查正常(针对既往存在异常的患儿)。未能满足缓解条件者为疾病活动。患者已获得缓解状态,但又出现以下情况中3项者为疾病复发:(1)发热;(2)脾大;(3)PLT < 100 × 10⁹/L;(4)高甘油三酯;(5)噬血现象;(6)铁蛋白水平升高。若出现新的神经系统症状可作为独立的复发条件。

1.5 资料的收集及统计学分析

以确诊HLH为观察起点,死亡日期作为观察终点,失访、末次随访时仍存活(包括缓解、疾病活动、疾病复发的患儿)的病例则确定为截尾病例。收集入选63例患儿相关临床表现、实验室检查、治疗情

况及疗效等资料。采用SPSS 16.0软件进行数据统计,其中使用Kaplan-Meier法绘制生存曲线,采用COX模型对相关因素进行单因素分析,筛选出有意义的因素进行多因素COX回归分析, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床特征

2.1.1 性别与年龄分布 63例HLH患儿中男女比例为2:1。婴儿期患儿4人(6%),幼儿期38人(60%),学龄前期8人(13%),学龄期8人(13%),青春期5人(8%)。

2.1.2 临床症状 63例(100%)患儿持续发热超过1周,62例(98%)出现肝肿大,55例出现脾肿大(87%),34例(54%)出现淋巴结肿大,11例(17%)出现皮肤黏膜出血,19例(30%)皮肤巩膜黄染,13例(21%)水肿,9例(14%)出现皮疹,6例(10%)出现神经系统症状。6例存在神经系统症状的患儿中,两例存在HLH脑病。

2.1.3 实验室检查 粒细胞减少49例(78%),粒细胞缺乏27例(43%),Hb < 90 g/L 43例(68%),PLT < 100 × 10⁹/L 45例(71%),纤维蛋白原 ≤ 1.5 g/L 30例(48%),甘油三酯 ≥ 3.0 mmol/L 39例(62%),谷丙转氨酶(ALT)升高50例(79%),低白蛋白血症43例(68%),总胆红素大于34 μmol/L 31例(49%),NK比值低于6%共49例(78%),铁蛋白 ≥ 500 μg/L 59例(94%),乳酸脱氢酶升高60例(95%)。骨髓细胞学提示存在噬血现象55例(87%)。

治疗2~3周后,血小板恢复情况分为以下几种:(1)治疗后血小板降低或原来降低者无回升趋势,共24人(38%);(2)血小板原来降低者有回升趋势,但未达到正常水平,共8人(13%);(3)血小板处于正常水平,共31人(49%)。

治疗2~3周后,谷丙转氨酶变化情况如下:(1)谷丙转氨酶较前升高13人;(2)谷丙转氨酶无变化1人;(3)谷丙转氨酶较前下降率低于20%者2人;(4)谷丙转氨酶率下降20%~50%者7人;(5)谷丙转氨酶率下降50%~80%者19人;(6)谷丙转氨酶率下降80%~100%者14人。其中1周内死亡者或1个月内未复查谷丙转氨酶者未列入分析(7例)。

2.1.4 合并症 合并感染共14例。巨细胞病毒及乙型肝炎病毒感染1例,好转出院但已失访。巨细胞病毒感染5例,4人缓解,1人死亡。EB病毒感染1例,已死亡。血培养阳性6例,1人死亡,4人缓

解,1人失访。恙虫病1例,已缓解。

合并肿瘤3例,其中淋巴瘤2例,1例初诊为B细胞淋巴瘤,未进行治疗,已失访,另1例经治疗后HLH仍活动,在外院诊断为非霍奇金淋巴瘤,至随访结束疾病仍活动;急性髓细胞性白血病1例,患儿确诊HLH时骨髓无白血病表现,经治疗后缓解,两年后复发并同时诊断存在急性髓细胞白血病(M3b),已死亡。合并系统性红斑狼疮1例,好转出院,已失访。

因各种合并症例数较少,未单独列入COX模型分析。

2.1.5 预后情况 至随访结束,处于缓解状态的患儿共30人(48%),未缓解的人数22人(35%),其中死亡20人,复发1人,活动1人。

死亡患儿中,13人死于初诊阶段,7人死于复发阶段。而1名患儿复发后重新获得缓解,但已失访。因此,实际共有9名患儿复发,其中78%的患儿最终死亡。复发出现的中位时间为确诊后2个月(3周至2年)。

2.2 单因素分析

将相关因素列入单因素COX模型,分析结果显示(表1),只有治疗2~3周后血小板恢复情况对预后的影响有显著性。同时,从图1可以看出,治疗后不同血小板恢复情况对患儿生存率有影响($\chi^2 = 14.065, P = 0.001$),即治疗后2~3周血小板有上升或恢复正常者其生存率较高。

将使用依托泊苷的病例单独建立模型,使用1d后体温是否恢复正常作为研究因素(体温正常者记为"1",体温未恢复正常者记为"0"),采用log-rank进行单因素生存分析。从图2可以看出,体温恢复正常者生存率较体温未恢复正常者高,两者之间的差异性具有统计学意义($\chi^2 = 5.808, P = 0.016$)。

2.3 多因素分析

单因素COX模型分析中,只有1个因素对预后的影响有统计学意义,因此,未再进一步行多因素分析。

2.4 生存曲线

本组患儿的平均生存时间为 1294 ± 120 d。从图3看,患儿3年生存率及5年生存率均为62.9%;而在确诊后的前4个月生存率下降明显,确诊后第1日至4个月,生存率由98.4%降至73.2%(1名患儿确诊当天即死亡),4个月以后生存率下降较缓慢。20名死亡患儿中,有16名(80%)发生在前4个月,其主要的死亡原因为感染及出血。4名死于治疗4个月以后,其中2名患儿死亡原因分别为感染休克、弥漫性血管内凝血,另2名死因不明(在外院治疗)。

表1 单因素分析结果

因素	$\hat{\beta}$ 值	SE(β)值	P值	RR值	95% CI
年龄	0.000	0.005	0.942	1.000	0.991, 1.009
性别	0.117	0.464	0.802	1.124	0.453, 2.789
脾脏大小	-0.018	0.081	0.827	0.983	0.839, 1.151
中性粒细胞	-0.002	0.056	0.976	0.998	0.894, 1.115
血红蛋白	-0.006	0.013	0.654	0.994	0.969, 1.020
血小板	-0.001	0.004	0.779	0.999	0.991, 1.007
治疗2~3周后血小板恢复	-0.845	0.279	0.002	0.429	0.248, 0.742
纤维蛋白原	-0.306	0.331	0.355	0.736	0.385, 1.408
甘油三酯	-0.094	0.121	0.435	0.910	0.718, 1.153
谷丙转氨酶	0.001	0.001	0.191	1.001	1.000, 1.002
治疗后谷丙转氨酶恢复	-0.005	0.003	0.127	0.995	0.989, 1.001
NK细胞比值	0.000	0.029	0.977	0.999	0.944, 1.057
铁蛋白	0.000	0.000	0.538	1.000	1.000, 1.000
乳酸脱氢酶	0.000	0.000	0.948	1.000	1.000, 1.000
确诊时间	-0.002	0.004	0.556	0.998	0.989, 1.006
确诊至治疗时间	0.051	0.051	0.318	1.052	0.952, 1.162
是否化疗	12.842	539.610	0.981	3.778	0
是否使用依托泊苷	1.032	1.045	0.323	2.805	0.362, 21.732
是否使用环孢素A	0.026	0.467	0.956	1.026	0.411, 2.560

图1 治疗后血小板恢复情况生存曲线 注:图例中"0"示治疗后血小板降低或原来降低无回升者;"1"示治疗前血小板降低者治疗后有回升,但未达到正常水平;"2"示治疗后血小板处于正常水平者。

图2 使用依托泊苷1d后体温恢复情况生存曲线 注:图例中"1"示体温正常者;"0"示体温未恢复正常者。

图3 HLH 患儿生存曲线

3 讨论

HLH可在任何年龄段发病,文献报道多见于2岁前^[6-7],其中家族性HLH发病多在1岁以内,男性发病略占优势^[8]。本组病例多见于1~3岁幼儿,男性患儿为女性的2倍,但年龄及性别对疾病预后无明显影响。本组病例中男性患儿比例较高,可能存在以下原因:(1)病例来源造成的偏差:病人多来自乡镇地区,女性患儿就诊率相对较低;(2)区域性基因染色体异常,有待进一步的基因研究。

HLH曾经是生存率极低的疾病,患儿1年生存率仅为5%^[4]。HLH-94方案制定后,HLH患儿总体5年生存率达(54±6)%^[7]。本研究病例生存分析结果显示3年及5年生存率均为62.9%。而其他地区的临床研究报告也提示HLH患儿的治疗效果较前改善^[9-10]。同时,本研究发现63名患儿在确诊后的前4个月生存率下降明显,80%的死亡病例发生在确诊后的前4个月,而复发出出现的中位时间为确诊后2个月。HLH-2004方案也指出,在HLH治疗最初的8周内病情最严重且容易复发。而本组患儿在前4个月的主要死亡原因为感染及出血,这可能与疾病本身及化疗所引起的免疫力降低、粒细胞及血小板减少均有关系。因此,在诊治的最初阶段,应密切监测相关指标,给予必要的对症支持治疗;对于出院的患儿,应强调规则用药,定期复诊,以降低复发率或病死率。

本组患儿诊断时血小板水平与预后无明显相关性,而治疗2~3周后血小板恢复情况对预后有影响,治疗2~3周后血小板有上升或恢复正常者其预后较好。血小板在机体的止血过程中起着重要作用,包括维持血管完整性及形成血栓参与止血过程。而HLH患儿存在高细胞因子血症,尤其是血清TNF-α及INF-γ升高,以及巨噬细胞和细胞毒性T淋巴细胞过度增生活化导致的噬血现象,均可使血

小板等血细胞减少^[8]。血小板的减少增加了出血的风险,可导致多脏器的出血,危及生命,本组死亡病例的主要死因之一即为出血,包括消化道、颅内及肺部的出血。国外研究亦指出血小板的变化可作为观察病情变化的指标,疾病缓解或恶化时,首先观察到的是血小板升高或下降^[5]。国内相关文献也认为血小板减少者预后不佳,死亡危险度升高^[11]。本研究结果提示诊断时血小板计数可能对疾病预后无明显影响,但需要注意动态监测血小板情况,若血小板持续下降或无上升趋势,其预后可能不佳。

依托泊苷为细胞毒类药物,对单核-巨噬细胞及组织细胞的选择性作用最强,此外也是细胞凋亡诱导剂,在HLH治疗中占有重要地位。相关报道指出,在使用其他药物(如地塞米松、静脉用丙种球蛋白等)仍不能控制病情,或确诊时病情已经很重的情况下,应选择包含依托泊苷的治疗方案^[12-13]。但是,在本研究中,依托泊苷的使用对HLH患儿的预后无明显影响,部分患儿使用依托泊苷后病情仍得不到控制。因而本研究将使用依托泊苷的病例单独建立模型分析,结果提示使用依托泊苷1d后体温恢复情况对预后有影响,体温恢复正常者预后较好。高细胞因子血症,尤其是血清INF-γ增高,是导致发热的主要原因^[8],而依托泊苷可抑制活动的淋巴细胞及高细胞因子血症,进而达到临床症状及体征的缓解^[14]。临床上观察到体温能迅速控制的患儿,治疗效果好,预后相对良好,且单因素分析亦得到相同结果。由此可见,体温可作为观察使用依托泊苷效果的观察指标,体温可迅速控制者预后较好。

本研究存在神经系统症状的6例患儿中,确诊为HLH脑病的2例患儿均已死亡,而其他4例有神经系统症状患儿中,2例已死亡,1例缓解但存在后遗症,提示若侵犯至神经系统,患儿预后不佳。相关临床研究亦发现伴有神经系统损害的HLH患儿的生存率低于无神经系统损害的患儿,认为神经系统损害是影响HLH患儿预后的高危因素之一^[15-16],而伴有神经系统损害的存活者可存在不同程度的神经系统后遗症^[8,17]。因此在诊疗过程中,对存在神经系统症状的患儿应予以重视,应进行相关检查并及时干预治疗;如条件许可,应对所有初诊HLH患儿常规进行脑脊液检查,及早发现神经系统损害。

本研究中,能发现相关病因的病例较少,其中与感染相关的例数最多,第二位为肿瘤,这与日本全国范围回顾性调查的结果一致^[18]。其中合并细菌或巨细胞病毒感染的患儿预后较好,但合并EB病毒感染或恶性肿瘤的患儿预后均不佳。有报道指出

EB病毒相关性HLH患儿的病死率为24.4%，甚至可达56.7%^[19-20]。而B细胞性淋巴瘤相关性HLH及T/NK细胞性淋巴瘤相关性HLH 5年生存率分别为48%、12%^[18]。结合相关文献，可以发现合并EB病毒及恶性肿瘤的患儿病情凶险，且EB病毒感染相关性HLH在亚洲国家较常见并较严重^[21]，需引起临床医生的重视，应积极寻找相关病因，及时制定相应的治疗措施，改善预后。

综上所述，HLH患儿的预后进一步改善，但前4个月时生存率下降明显，病情最重且易反复。HLH患儿预后与多因素相关，本研究显示治疗后2~3周患儿血小板下降或无回升趋势者，使用依托泊苷治疗后1d体温不能恢复正常者，预后均较差。此外，患儿合并神经系统浸润、EB病毒感染或恶性肿瘤时，病情凶险，应引起重视。

[参 考 文 献]

[1] Gholam C, Grigoriadou S, Gilmour KC, Gaspar HB. Familial haemophagocytic lymphohistiocytosis: advances in the genetic basis, diagnosis and management[J]. *Clin Exp Immunol*, 2011, 163(3): 271-283.

[2] Henter JL, Horne A, Aricò M, Egeler RM, Filipovich AH, Imashuku S, et al. HLH-2004: diagnostic and therapeutic guidelines for hemophagocytic lymphohistiocytosis[J]. *Pediatr Blood Cancer*, 2007, 48(2): 124-131.

[3] Henter JL, Elinder G, Söder O, Ost A. Incidence in Sweden and clinical features of familial hemophagocytic lymphohistiocytosis [J]. *Acta Paediatr Scand*, 1991, 80(4): 428-435.

[4] Janka GE. Familial hemophagocytic lymphohistiocytosis[J]. *Eur J Pediatr*, 1983, 140(3): 221-230.

[5] Janka G, Imashuku S, Elinder G, Schneider M, Henter JL. Infection- and malignancy-associated hemophagocytic syndromes. Secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis[J]. *Hematol Oncol Clin North Am*, 1998, 12(2): 435-444.

[6] 广东省小儿噬血细胞综合征协作组. 儿童噬血细胞综合征68例临床研究[J]. *中国小儿血液与肿瘤杂志*, 2009, 14(1): 20-22.

[7] Trottestam H, Horne A, Aricò M, Egeler RM, Filipovich AH, Gadner H, et al. Chemoimmunotherapy for hemophagocytic lymphohistiocytosis: long-term results of the HLH-94 treatment protocol[J]. *Blood*, 2011, 118(17): 4577-4584.

[8] Janka GE. Familial and acquired hemophagocytic lymphohistiocytosis[J]. *Eur J Pediatr*, 2007, 166(2): 95-109.

[9] Ramachandran B, Balasubramanian S, Abhishek N, Ravikumar KG, Ramanan AV. Profile of hemophagocytic lymphohistiocytosis in children in a tertiary care hospital in India[J]. *Indian Pediatr*, 2011, 48(1): 31-35.

[10] Kim HK, Kim HG, Cho SJ, Hong YM, Sohn S, Yoo ES, et al. Clinical characteristics of hemophagocytic lymphohistiocytosis related to Kawasaki disease[J]. *Pediatr Hematol Oncol*, 2011, 28(3): 230-236.

[11] 石杨, 王丽杰. 小儿噬血细胞综合征临床特点及预后危险因素分析[J]. *中国现代医学杂志*, 2011, 21(5): 645-651.

[12] Janka GE, Schneider EM. Modern management of children with haemophagocytic lymphohistiocytosis[J]. *Br J Haematol*, 2004, 124(1): 4-14.

[13] Maakaroun NR, Moanna A, Jacob JT, Albrecht H. Viral infections associated with haemophagocytic syndrome[J]. *Rev Med Virol*, 2010, 20(2): 93-105.

[14] Tang YM, Xu XJ. Advances in hemophagocytic lymphohistiocytosis: pathogenesis, early diagnosis/differential diagnosis, and treatment[J]. *Sci World J*, 2011, 11(3): 697-708.

[15] Imashuku S, Hyakuna N, Funabiki T, Ikuta K, Sako M, Iwai A, et al. Low natural killer activity and central nervous system disease as a high-risk prognostic indicator in young patients with hemophagocytic lymphohistiocytosis[J]. *Cancer*, 2002, 94(11): 3023-3031.

[16] 王冠玲, 胡群, 张柳清, 刘爱国, 刘双又, 张耀东, 等. 儿童噬血细胞综合征死亡相关因素分析[J]. *临床儿科杂志*, 2010, 28(5): 438-441.

[17] Horne A, Trottestam H, Aricò M, Egeler RM, Filipovich AH, Gadner H, et al. Frequency and spectrum of central nervous system involvement in 193 children with haemophagocytic lymphohistiocytosis [J]. *Br J Haematol*, 2008, 140(3): 327-335.

[18] Ishii E, Ohga S, Imashuku S, Yasukawa M, Tsuda H, Miura I, et al. Nationwide survey of hemophagocytic lymphohistiocytosis in Japan[J]. *Int J Hematol*, 2007, 86(1): 58-65.

[19] 金颖康, 谢正德, 杜忠东, 杨双, 申昆玲. 儿童 Epstein-Bar 病毒相关性噬血细胞性淋巴组织细胞增生症的回顾性分析[J]. *首都医科大学学报*, 2010, 31(2): 192-196.

[20] Imashuku S, Teramura T, Tauchi H, Ishida Y, Otoh Y, Sawada M, et al. Longitudinal follow-up of patients with Epstein-Bar virus-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis[J]. *Haematologica*, 2004, 89(2): 183-188.

[21] Imashuku S. Clinical features and treatment strategies of Epstein-Bar virus-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis[J]. *Crit Rev Oncol Hematol*, 2002, 44(3): 259-272.

(本文编辑: 邓芳明)