doi: 10.7499/j.issn.1008-8830.2019.11.004

论著·临床研究

SCMC APL-2010 方案治疗 44 例儿童急性 早幼粒细胞白血病的临床总结

王卓 沈树红 汤燕静 薛惠良 胡文婷 潘慈 汤静燕 顾龙君 陈静

(上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心血液肿瘤科, 上海 200127)

[摘要] **目的** 评价 SCMC APL-2010 方案治疗儿童急性早幼粒细胞白血病 (APL) 的疗效。**方法** 收集 2010 年 4 月至 2016 年 7 月采用 SCMC APL-2010 方案治疗的 44 例 APL 患儿的临床资料, 采用 Kaplan-Meier 生存分析评估患儿的无事件生存 (EFS) 率和总生存 (OS) 率。**结果** 44 例 APL 患儿中, 42 例 (95%) 经 1 个疗程达完全缓解 (CR), 1 例经 2 个疗程达 CR, 总 CR 率为 98%, 9 年 EFS 率为 $96\% \pm 3\%$, OS 率为 $97.7\% \pm 2.2\%$ 。不良事件中, 发生感染 41 例 (93%), 粒细胞减少 29 例 (66%), 分化综合征 12 例 (27%, 其中死亡 1 例), 肝功能异常 16 例 (36%), 胃肠道不良反应 12 例 (27%), QT 间期延长 7 例 (16%), 睾丸炎 1 例 (2%), 无第二肿瘤发生。**结论** SCMC APL-2010 方案治疗儿童 APL 预后好, 可获得长期生存, 但治疗相关感染较多。
[中国当代儿科杂志, 2019, 21(11): 1073-1078]

[关键词] 急性早幼粒细胞白血病; SCMC APL-2010 方案; 生存率; 儿童

Clinical effect of the SCMC APL-2010 regimen in treatment of acute promyelocytic leukemia in children: an analysis of 44 cases

WANG Zhuo, SHEN Shu-Hong, TANG Yan-Jing, XUE Hui-Liang, HU Wen-Ting, PAN Ci, TANG Jing-Yan, GU Long-Jun, CHEN Jing. Department of Hematology/Oncology, Shanghai Children's Medical Center, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200127, China (Chen J, Email: chen-jing@scmc.com.cn)

Abstract: Objective To study the clinical effect of the SCMC APL-2010 regimen in the treatment of acute promyelocytic leukemia (APL) in children. **Methods** A retrospective analysis was performed for the clinical data of 44 children with APL who received treatment with the SCMC APL-2010 regimen between April 2010 and July 2016. The Kaplan-Meier survival analysis was used to evaluate event-free survival (EFS) rate and overall survival (OS) rate. **Results** Of the 44 children with APL, 42 (95%) achieved a complete remission (CR) after one course of treatment and 1 achieved CR after two courses of treatment, with an overall CR rate of 98%. The 9-year EFS and OS rates were $96\% \pm 3\%$ and $97.7\% \pm 2.2\%$ respectively. As for adverse events, 41 (93%) had infection, 29 (66%) had granulocyte reduction, 12 (27%, 1 died) had differentiation syndrome, 16 (36%) had liver dysfunction, 12 (27%) had adverse gastrointestinal reactions, and 7 (16%) had QT prolongation, 1 (2%) had orchitis, and no secondary neoplasm was observed. **Conclusions** Children with APL receiving the SCMC APL-2010 regimen have a good prognosis and can achieve a long-term survival, while treatment-related infection is commonly seen.

[Chin J Contemp Pediatr, 2019, 21(11): 1073-1078]

Key words: Acute promyelocytic leukemia; SCMC APL-2010 regimen; Survival rate; Child

[收稿日期] 2019-05-27; **[接受日期]** 2019-08-26

[基金项目] 浦东新区科技发展基金民生科研专项资金医疗卫生项目 (PKJ2016-Y36); 国家自然科学基金 (81200374)。

[作者简介] 王卓, 男, 博士, 主治医师。

[通信作者] 陈静, 女, 副主任医师。Email: chen-jing@scmc.com.cn。

急性早幼粒细胞白血病 (acute promyelocytic leukemia, APL) 是一种具有特征性细胞遗传学、形态学特点以及显著凝血异常等临床特点的急性白血病, 由 t(15;17)(q22;21) 染色体易位、融合形成 PML-RAR α 基因引起。儿童期 APL 是一种少见类型的白血病, 占儿童急性髓系细胞白血病 (acute myeloid leukemia, AML) 的 5%~7%^[1]。APL 治疗经历了几个不同阶段。在全反式维甲酸 (all-trans retinoic acid, ATRA) 治疗 APL 前, 化疗方案以蒽环类化疗药物为基础, 其完全缓解 (complete response, CR) 率约 70%~80%, 5 年无病生存率仅有 35%~45%, 且早期病死率高^[2]。ATRA 诱导分化治疗开启了 APL 治疗的新篇章, ATRA 联合蒽环类化疗药物成为标准治疗方案, CR 率可达 90% 以上, 治愈率达 80%^[3]。近二十年来, 三氧化二砷 (arsenic trioxide, ATO) 的应用令 APL 疗效逐年提高, 优于标准治疗方案, 5 年无病生存率可达 95%^[4]。自 1998 年起, 上海儿童医学中心 (Shanghai Children's Medical Center, SCMC) 建立了规范的 APL 治疗方案, 又于 2010 年进行了方案修改, 将砷剂加入诱导化疗方案, 制订出 SCMC 儿童 APL 治疗方案 (即 SCMC APL-2010)。本研究对 2010 年 4 月至 2016 年 7 月就诊于本中心并采用 SCMC APL-2010 方案治疗的 44 例初诊 APL 患儿的 9 年治疗情况进行总结分析, 为将来修正治疗方案提供循证依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象

选择 2010 年 4 月至 2016 年 7 月在本中心血液肿瘤科就诊并首次住院接受 SCMC APL-2010 方案治疗的 APL 患儿为研究对象。纳入标准: (1) 年龄 <18 周岁; (2) 首次连续住院治疗时间 >1 周; (3) 随访资料齐全。共纳入 44 例 APL 患儿, 其中男 27 例 (61%), 女 17 例 (39%), 男女比例为 1.6:1, 中位确诊年龄 7.9 (2.2~15.1) 岁。

1.2 诊断方法

APL 诊断标准为^[5]: 具有典型的 APL 细胞形态学表现, 分子生物学检查 PML-RAR α 阳性或细胞遗传学检查 t(15;17) 阳性为典型 APL。非典型 APL 显示为少见的 PLZF-RAR α 、NuMA-RAR α 、

NPM-RAR α 、Stat5b-RAR α 、F1P1L1-RAR α 等分子改变。

1.3 危险度分组

诱导治疗按危险度分组^[5]: (1) 低危组: 诱导治疗前外周血 WBC $\leq 10 \times 10^9/L$; (2) 高危组: 诱导治疗前外周血 WBC $>10 \times 10^9/L$ 。

1.4 资料收集

所有患儿均在我院规律治疗, 收集患儿年龄、性别、血常规、乳酸脱氢酶、不良事件及其治疗方法等资料。

1.5 治疗

1.5.1 全身化疗 一旦确诊立即按 SCMC APL-2010 方案开始治疗, 诱导治疗得到 CR 后接受巩固和维持治疗, 总疗程共 18 个月。具体方案如下: (1) 诱导治疗: ATRA 每日 25 mg/m², 第 1~28 天, 口服; ATO 每日 0.2 mg/kg, 第 1~28 天, 静脉滴注。起病时 WBC $>10 \times 10^9/L$ 或第 8 天后 WBC $>20 \times 10^9/L$, 加用柔红霉素 (daunorubicin, DNR) 每日 40 mg/m², 第 8~10 天, 静脉滴注; 阿糖胞苷 (cytarabine, Ara-c) 每日 100 mg/m², 每 12 h 1 次, 第 8~12 天, 皮下注射。(2) 巩固治疗 1: DNR 每日 40 mg/m², 第 1~3 天, 静脉滴注; Ara-c 每日 100 mg/m², 每 12 h 1 次, 第 1~7 天, 皮下注射。巩固治疗 2: ATRA 每日 25 mg/m², 第 1~28 天, 口服; ATO 每日 0.2 mg/kg, 第 1~28 天, 静脉滴注。巩固治疗 3 同巩固治疗 1。(3) 维持治疗: ATRA 每日 25 mg/m², 第 1~28 天, 口服; Ara-c 每日 75 mg/m², 每 12 h 1 次, 第 8~12 天, 皮下注射; 高三尖杉每日 3 mg/m², 第 1~7 天, 静脉滴注; ATO 每日 0.2 mg/kg, 第 1~14 天, 静脉滴注。休疗 14 d, Ara-c 每日 75 mg/m², 每 12 h 1 次, 第 8~12 天, 皮下注射; 巯嘌呤每日 75 mg/m², 第 1~7 天, 口服。共 4 轮, 终止治疗。

1.5.2 预防中枢神经系统白血病 APL 患儿在 CR 后接受三联 (甲氨蝶呤、Ara-c、地塞米松) 鞘注, 巩固治疗每阶段各 1 次, 维持治疗前 3 轮各 1 次, 共 6 次。

1.6 疗效评估及不良事件

疗效评估参照《中国急性早幼粒细胞白血病诊疗指南 (2014 年版)》^[5]。诱导阶段评估: 骨髓评价一般在 4~6 周、血细胞计数恢复后 (WBC $\geq 2 \times 10^9/L$, PLT $\geq 80 \times 10^9/L$) 进行, 此时,

细胞遗传学一般正常。分子学评估一般在2个巩固疗程后判断。2年内每3个月应用PCR检测融合基因，融合基因持续阴性者继续维持治疗；融合基因阳性者4周后复查，复查阴性者继续维持治疗，阳性者按复发处理。不良事件参照常见不良事件评价标准（Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE）分类、分级^[6]。

1.7 随访内容

对所有患儿采用门诊、电话、网络等方式随访预后，随访日期截至2019年3月31日，中位随访时间为5.29（0.04~8.96）年，随访内容包括是否出现复发、任何原因的死亡、不良事件（感染、第二肿瘤）、失访等。失访指完成全部治疗后并且无事件下失去联系。早期死亡指自治疗开始30 d内死亡的患儿。

1.8 统计学分析

采用SPSS 17.0软件进行数据处理。非正态分布计量资料以中位数（范围）表示，组间比较采用Wilcoxon秩和检验。计数资料采用例数和百分比（%）表示，组间比较采用 χ^2 检验或Fisher确切概率法。采用Kaplan-Meier法进行生存分析，并绘制生存曲线，组间生存率的比较采用log-rank法。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。无事件生存（event-free survival, EFS）期指自诊断至第一次事件或末次随访日期。这段时间的生存率称为EFS率。总生存（overall survival, OS）期指自诊断至死亡或末次随访时间。这段时间的生存率为OS率。

2 结果

2.1 临床特征

44例APL患儿中，中位WBC 16.3（0.9~117.5） $\times 10^9/L$ ，中位PLT 50（11~334） $\times 10^9/L$ ，中位乳酸脱氢酶 884（508~1877）U/L。高危组16例，低危组28例，两组间年龄、性别、PLT比较差异无统计学意义（ $P > 0.05$ ）；高危组乳酸脱氢酶增高比例高于低危组（ $P < 0.05$ ）。见表1。

2.2 诱导缓解

44例APL患儿均接受诱导缓解治疗，1例在诱导治疗阶段第17天因严重分化综合征（differentiation syndrome, DS）导致急性呼吸窘迫

综合征（acute respiratory distress syndrome, ARDS）早期死亡，余43例经1个疗程达CR为42例，1例经2个疗程达CR，总CR率为98%，中位CR时间为34（29~51）d。

2.3 治疗疗效和生存分析

44例患儿中1例融合基因监测连续2次阳性（骨髓涂片细胞学CR）后行造血干细胞移植，目前存活。Kaplan-Meier生存分析显示，9年EFS率为96% $\pm$ 3%，OS率为97.7% $\pm$ 2.2%（图1~2）。低危组9年EFS率和OS率为100%，均高于高危组（9年EFS率为88% $\pm$ 8%，9年OS率为94.1% $\pm$ 8.3%），但两组差异无统计学意义（ $\chi^2=3.388$ ， $P=0.070$ ； $\chi^2=1.709$ ， $P=0.208$ ）。见图3~4。

表1 高危组和低危组临床特征比较

项目	高危组 (n=16)	低危组 (n=28)	χ^2/Z 值	P值
确诊年龄 [中位数(范围),岁]	8.9 (1.7~14.8)	7.5 (2.2~15.1)	1.411	0.203
性别[例(%)]				
男	10(64)	17(61)	0.041	0.871
女	6(38)	11(39)		
PLT[例(%), $\times 10^9/L$]				
≤ 40	13(81)	15(54)	2.226	0.152
>40	3(19)	13(46)		
乳酸脱氢酶[例(%)]*				
正常	0(0)	8(30)	6.404	0.012
增高	16(100)	19(70)		

注：*示低危组中1例乳酸脱氢酶数据缺失。

图1 44例APL患儿9年无事件生存曲线

图2 44例APL患儿9年总体生存曲线

图4 高危组和低危组APL患儿9年总体生存曲线

图3 高危组和低危组APL患儿9年无事件生存曲线

2.4 治疗相关不良事件分析

44例APL患儿中，发生感染41例(93%)、粒细胞减少29例(66%)、肝功能损害1~2级16例(36%)、DS 12例(27%，其中死亡1例)、胃肠道疾病12例(27%)、QT间期延长7例(16%)、睾丸炎1例(2%)。

12例发生DS患儿的具体症状包括：发热、呕吐、头晕头痛、水肿、呼吸困难等。其中1例因严重DS发生ARDS早期死亡，其他DS患儿停ATRA后症状消失再次应用，未再出现DS。DS治疗方法：运用糖皮质激素、利尿、ATRA减量或停药等。见表2。

低危组不良事件发生率与高危组相比，差异无统计学意义($P>0.05$)，见表3。

表2 12例APL患儿发生DS的基本情况

病例	性别	年龄(岁)	发生时间	持续天数(d)	症状	治疗
1	男	12.0	化疗后第2天	17	呕吐、头痛、体重增加	GC、利尿
2	男	6.8	化疗后第2天	8	头痛、呕吐	GC
3	男	6.1	化疗后第3天	9	头痛、呕吐	GC
4	男	9.3	化疗后第3天	24	头痛、呕吐	GC、ATRA 减量及停用
5	男	4.6	化疗后第3天	20	发热、体重增加、呼吸困难	GC、速尿
6	男	3.4	化疗后第3天	12	发热、水肿	GC、速尿
7	男	15.1	化疗后第2天	22	呕吐、头晕头痛	GC、速尿及 ATRA 减量
8	男	7.1	化疗后第3天	14	呕吐、发热	GC
9	女	4.7	化疗后第11天	9	头痛、水肿	GC、速尿
10	女	12.6	化疗后第3天	24	头痛、呕吐	GC
11	女	10.9	化疗后第7天	10	发热、ARDS	GC、速尿及转ICU
12	男	9.2	化疗后第6天	24	呕吐、水肿	GC

注：[GC]糖皮质激素；[ATRA]全反式维甲酸；[ARDS]急性呼吸窘迫综合征；[ICU]重症监护室。

表 3 高危组和低危组不良事件比较 [例(%)]

不良事件	高危组 (n=16)	低危组 (n=28)	χ^2 值	P 值
感染	15(94)	26(93)	0.013	0.910
粒细胞减少	12(75)	17(61)	0.398	0.528
胃肠道疾病	5(31)	7(25)	0.201	0.654
分化综合征	4(24)	8(29)	0.065	0.798
QT 间期延长	2(12)	5(18)	0.218	0.640
肝功能损害 1~2 级	6(38)	10(36)	0.014	0.906
睾丸炎	1(6)	0(0)	-	0.181

3 讨论

APL 是一类基本不需造血干细胞移植, 可通过常规化疗就能治愈的 AML 亚型。临床研究显示, ATRA 和砷剂治疗 APL 能获得更高 CR 率, 可达 90% 以上, 但仍存在 15%~25% 复发率^[4,7-8]。APL 的发病原理是 PML-RAR α 融合蛋白引起细胞分化停止在早幼粒细胞阶段^[9-10]。最早在 1980 年研究者发现 ATRA 可以作用于 PML-RAR α 诱导早幼粒细胞向粒细胞阶段分化成熟^[11]。既往研究显示, 诱导治疗采用 ATRA 联合化疗能获得较高的 CR 率(96%)、EFS 率(76%)及 OS 率(80%)^[12]。本中心 2008 年报道的 AML-XH-99-M3 方案临床总结中, 以 ATRA 联合化疗为基础的 7 年 EFS 率达 73.4% $\pm$ 9.4%, OS 率为 91.2% $\pm$ 6.0%^[13]。虽然在当时取得了很大进步, 但是单用 ATRA CR 时间较短, 另外 ATRA 联合化疗还是有部分患者复发。后来研究发现, ATRA 和砷剂治疗 APL 是通过诱导 PML-RAR α 融合蛋白的降解从而清除了 APL 细胞^[14]。临床上通过联合化疗, APL 患者能获得 CR, 进一步研究显示 ATRA 和砷剂联合常规化疗有助于清除残留白血病干细胞。

国外报道标准诱导治疗 APL 能较好地降低死亡率(特别是早期死亡), 改善预后, 成人 CR 率达 95%, 治愈率超过 80%^[3]。巩固治疗阶段, 对于高危 APL 患者, Ara-c 可以有效地延长 EFS 期和 OS 期。ATRA 和砷剂治疗 APL, 儿童 CR 率达 95.4%, 6 年 EFS 率达 92.5% $\pm$ 4.2%^[15]。本研究患儿接受诱导治疗, 除早期死亡 1 例外, 1 或 2 个疗程后均达到 CR, 9 年 EFS 率为 96% $\pm$ 3%, OS 率为 97.7% $\pm$ 2.2%, 接近欧美等发达国家水平。高危组乳酸脱氢酶增高比例高于低危组, 但两组 EFS

率和 OS 率无差异, 说明当前治疗方案可以达到满意的 CR 率和长期生存。ATRA 和砷剂应用使 APL 复发大幅减少, 相对而言, 早期死亡的控制尤为重要。其中凝血功能障碍和 DS 是早期死亡最主要的原因。本组 1 例因发生 DS 导致 ARDS 早期死亡, 虽在治疗早期应用了糖皮质激素, 但并未避免患儿死亡发生。关于糖皮质激素预防 DS 的回顾性研究发现, 预防使用糖皮质激素可以降低严重 DS 的发生率, 但并不能降低 DS 病死率^[16]; ATRA 可以促进 uPA 受体表达抑制 uPA 诱发的纤溶亢进, 同时 ATRA 抑制 annexin II 的表达, 从而迅速纠正出血表现^[17]。本组无凝血功能障碍相关早期死亡, 可能与我们在病例确诊后尽早使用 ATRA 有关。

对于 APL 儿童以及老年患者, ATRA 和砷剂联合化疗方案中, 完成化疗后易发生骨髓抑制, 发生粒细胞减少继发不同程度感染, 是导致治疗相关死亡的重要原因。ATRA 和砷剂用于治疗 APL 被证明是安全的。与常规化疗药物相比, 砷剂较少导致骨髓抑制。砷剂常见的不良反应有 1~2 级肝功能损害、胃肠道不良反应、QT 间期延长等, 以上不良事件大多在减量或停药后恢复正常^[9-10]。本研究中 93% 患儿在治疗过程中均发生不同程度的治疗相关感染。16% 患儿出现 QT 间期延长, 无患儿停用砷剂。国外报道约有 3%~30% 患者出现 DS, 相关病死率约占 5%~29%^[2], 本研究中 27% (12/44) 患儿出现 DS, 1 例死亡(1/12, 8%), ATRA 停用、减量或激素治疗后, 未再发生 DS。

目前 APL 治疗的焦点在于巩固治疗和维持治疗。APL 治疗目的是维持高 EFS 率和 OS 率, 减少患者的支出和提高生活质量。虽然 Xin 等^[18] 研究显示 ATRA 和砷剂联合化疗较单独化疗能取得很好的 OS 率和 EFS 率。研究显示, 低危组维持治疗与经典 ATRA 联合化疗方案相比, 巩固治疗后仅用 ATRA 和砷剂维持治疗不但可以获得更长的 EFS 期和 OS 期, 治疗相关的不良事件发生率也显著降低^[19]。维持治疗中联合化疗是导致感染发生率高的主要原因。儿童各脏器尚未发育完全, 经过强化疗导致骨髓抑制继发严重感染, 易导致多脏器功能受损, 随之治疗相关死亡风险增加。本研究所有患儿治疗方案一致, 未按照常规危险度分层治疗。虽获得较高的 EFS 率和 OS 率, 但对于低危患儿, 化疗强度较大, 治疗相关感染增多,

从而影响患儿近期甚至远期生活质量, 导致患儿治疗费用及家庭生活支出随之增加。

综上所述, 本研究回顾分析了SCMC APL-2010方案治疗儿童APL 9年的情况, 远期疗效接近发达国家水平, 但也发现方案的不足。这为我们修正方案和将来治疗儿童APL积累了宝贵的经验。目前中国儿童肿瘤协作组(China Children Cancer Group, CCCG)制定出了中国儿童APL规范化治疗方案(即CCCG-APL 2017方案), 按照危险度分层来治疗儿童APL。我们的目标是对不同的目标人群, 依据危险度分层保证高的EFS率和OS率前提下采用合适的治疗强度治疗。

[参 考 文 献]

- [1] Testi AM, Pession A, Diverio D, et al. Risk-adapted treatment of acute promyelocytic leukemia: results from the International Consortium for Childhood APL[J]. *Blood*, 2018, 132(4): 405-412.
- [2] Zhao H, Zhao Y, Zhang Y, et al. Difference in causes and prognostic factors of early death between cohorts with de novo and relapsed acute promyelocytic leukemia[J]. *Ann Hematol*, 2018, 97(3): 409-416.
- [3] Tao S, Wang C, Chen Y, et al. Long-term effect of all-trans retinoic acid and arsenic trioxide sequential maintenance in patients with acute promyelocytic leukemia[J]. *Leuk Lymphoma*, 2019, 60(3): 711-719.
- [4] Lo-Coco F, Cicconi L. What is the standard regimen for patients with acute promyelocytic leukemia?[J]. *Curr Hematol Malig Rep*, 2014, 9(2): 138-143.
- [5] 中华医学会血液学分会, 中国医师协会血液科医师分会. 中国急性早幼粒细胞白血病诊疗指南(2014年版)[J]. *中华血液学杂志*, 2014, 35(5): 475-477.
- [6] Dueck AC, Mendoza TR, Mitchell SA, et al. Validity and reliability of the US National Cancer Institute's patient-reported outcomes version of the Common Terminology Criteria for Adverse Events (PRO-CTCAE)[J]. *JAMA Oncol*, 2015, 1(8): 1051-1059.
- [7] Adès L, Guerci A, Raffoux E, et al. Very long-term outcome of acute promyelocytic leukemia after treatment with all-trans retinoic acid and chemotherapy: the European APL Group experience[J]. *Blood*, 2010, 115(9): 1690-1696.
- [8] Quezada G, Kopp L, Estey E, et al. All-trans-retinoic acid and arsenic trioxide as initial therapy for acute promyelocytic leukemia[J]. *Pediatr Blood Cancer*, 2008, 51(1): 133-135.
- [9] Liu CC, Wang H, Wang WD, et al. Consolidation therapy of arsenic trioxide alternated with chemotherapy achieves remarkable efficacy in newly diagnosed acute promyelocytic leukemia[J]. *Onco Targets Ther*, 2015, 8: 3297-3303.
- [10] Dos Santos GA, Kats L, Pandolfi PP. Synergy against PML-RARa: targeting transcription, proteolysis, differentiation, and self-renewal in acute promyelocytic leukemia[J]. *J Exp Med*, 2013, 210(13): 2793-2802.
- [11] Masciarelli S, Capuano E, Ottone T, et al. Retinoic acid and arsenic trioxide sensitize acute promyelocytic leukemia cells to ER stress[J]. *Leukemia*, 2018, 32(2): 285-294.
- [12] Bapna A, Nair R, Tapan KS, et al. All-trans-retinoic acid (ATRA): pediatric acute promyelocytic leukemia[J]. *Pediatr Hematol Oncol*, 1998, 15(3): 243-248.
- [13] 陈静, 顾龙君, 汤静燕, 等. AML-XH-99-M3方案治疗33例儿童急性早幼粒细胞白血病临床总结[J]. *中国当代儿科杂志*, 2008, 10(3): 329-332.
- [14] Kogan SC. Curing APL: differentiation or destruction?[J]. *Cancer Cell*, 2009, 15(1): 7-8.
- [15] Cheng Y, Zhang L, Wu J, et al. Long-term prognosis of childhood acute promyelocytic leukaemia with arsenic trioxide administration in induction and consolidation chemotherapy phases: a single-centre experience[J]. *Eur J Haematol*, 2013, 91(6): 483-489.
- [16] Esteve J, Escoda L, Martín G, et al. Outcome of patients with acute promyelocytic leukemia failing to front-line treatment with all-trans retinoic acid and anthracycline-based chemotherapy (PETHEMA protocols LPA96 and LPA99): benefit of an early intervention[J]. *Leukemia*, 2007, 21(3): 446-452.
- [17] Liu Y, Wang Z, Jiang M, et al. The expression of annexin II and its role in the fibrinolytic activity in acute promyelocytic leukemia[J]. *Leuk Res*, 2011, 35(7): 879-884.
- [18] Xin L, Wan-jun S, Zeng-jun L, et al. A survival study and prognostic factors analysis on acute promyelocytic leukemia at a single center[J]. *Leuk Res*, 2007, 31(6): 765-771.
- [19] Liang B, Zheng Z, Shi Y, et al. Maintenance therapy with all-trans retinoic acid and arsenic trioxide improves relapse-free survival in adults with low- to intermediate-risk acute promyelocytic leukemia who have achieved complete remission after consolidation therapy[J]. *Onco Targets Ther*, 2017, 10: 2305-2313.

(本文编辑: 王颖)